Un peu de pomologie …

Partie 3

Type de l'arbre : *voir le schéma ci-dessous.* L'essence fruitière *(parfois la variété)* induit un port spécifique *(fastigié retombant, étalé, etc.)*

A Fuseau	**C** Ove élargi	**E** Secteur sphérique étroit	**G** Dôme	**I** Sphère	**K** Cylindre	**L** Dôme retombant
B Ove étroit	**D** Cône	**F** Secteur sphérique élargi	**H** Dôme étalé	**J** Sphère aplatie		**M** Cône retombant

Présence de maladie : Dans cette rubrique, il s'agit de citer tous les détails relatifs à l'état sanitaire du fruit et de l'arbre. Préciser à chaque fois si l'attaque est faible ou forte.

- si l'on voit sur le fruit et/ou le feuillage :

- ☞ Un revêtement noirâtre qui s'enlève au frottement => fumagine : *ceci n'est pas une maladie !*
- ☞ Des ronds noirs ayant abîmé la peau du fruit => tavelure.
- ☞ De la poudre blanche => oïdium.
- ☞ Des fruits véreux => carpocapse.
- ☞ Les fruits (prunes) s'allongent et se dessèchent => maladie de la pochette.
- ☞ De la moisissure qui se forme en ronds concentriques => monilia.

- sur l'arbre :

- ☞ Des chancres sur les branches.
- ☞ Du lichen.
- ☞ De la mousse sur le tronc.
- ☞ Du gui (combien de boules ?)

Présence de ravageurs : Chenilles, cochenilles, insectes xylophages, pucerons… , dégâts (sur feuilles, fruits, bois) et degré de l'attaque.

Présence d'insectes auxiliaires des vergers : coccinelles par exemple (larves et adultes), type (pollinisateurs) et quantité.

Production : Préciser à chaque fois la charge de fruits (beaucoup ou peu) ; si la production est régulière (production modérée mais chaque année) ou alternée (une grosse production tous les 2 ou 3 ans).

Feuilles : Rapprocher les feuilles prélevées sur l'arbre, d'une des formes du schéma ci-dessous. Faire sécher à plat ou photocopier les feuilles est plus explicite encore.

Indépendamment de la forme, il faudra préciser également leur taille, si elles sont de forme régulière, leur couleur, aspect (lisse, velouté), si le bord est denté (simple ou double, finement ou grossièrement), nervures, etc. Une précision sur la densité du feuillage et son homogénéité, revêt son importance. Concernant l'état sanitaire, n'hésitez pas à relever toutes vos observations : présence de ravageurs, d'auxiliaires, signes de carences, etc. Si le feuillage reflète l'état sanitaire de l'arbre, on ignore parfois qu'il possède des caractéristiques spécifiques à la variété, d'où l'intérêt de l'observer de près !



A et A' : fusiforme, B : biogivale, C : elliptique, D : ronde, E : lancéolée, F : ovalaire, G : cordiforme

Floraison : Donner la date approximative à laquelle l'arbre est en pleine fleur (moitié au moins des fleurs ouvertes) et toutes précisions utiles (floraison échelonnée, très tardive ou au contraire précoce, etc.).

Remarques / particularités : Toutes informations, précisions méritant d'être mentionnées.

Certaines illustrations ont été puisées dans les ouvrages suivants :

La description pomologique de l'AFCEV, "Détermination rapide des variétés de fruits" de J. Vercier, "Pommiers à cidre" de l'INRA éditions, "Variétés anciennes d'arbres fruitiers recommandées pour la culture d'amateurs" de M. Lateur et C. Populer.

Un peu de pomologie … gros plan sur les belles cerises du Barrois

FICHE VARIETALE CERISE

Nom local : Cerise de miel

A rapprocher de : Cerise de Dame

Origine : Très ancienne variété connue et cultivée sur le secteur de Brillon-en-Barrois

LE FRUIT

Poids :

Épiderme : Rose couvert de rouge pourpre sur plus de la moitié du fruit, transparent; moucheté de rouge sur les parties claires.

Taille : Petite façon griotte H : l : E :

Forme : Ronde aplatie, avec cuvette pédonculaire

Pédoncule : Solitaire ou par deux, longueur environ 5 cm, assez régulier, assez fin

Sillon : Légèrement visible, un peu creusé

Point Pistillaire : Centré, petit point clair, dans une légère cuvette.

Chair : Blanche, molle transparente, très sucrée, légèrement acidulée, non adhérente au noyau, très juteuse, jus incolore.

Noyau : Non adhérent

Maturité : Fin juin/début juillet

Conservation : Passe très vite

Utilisation: Surtout en kirsch car bon rendement. Petite cerise agréable à marauder

L'ARBRE :

Floraison :

Productivité : Bonne

PARTICULARITÉS

Un peu d'histoire locale. Brillon est terre de vergers et surtout de cerises. Rouges, noires ou blanches, elles ont longtemps contribué à l'alimentation et à l'économie familiale des Brillonais. Si une grande partie était distillée en kirsch, ce n'était pas là leur seul usage !

Devoir du 10 juillet 1914 : Composition française, la cueillette des cerises (à Brillon) - Source documentation : « Brillon en Balade » par Jean François Henry.

« Hier, l'après-midi, je suis allé faire la cueillette des cerises avec mon camarade Ernest et sa mère …

… Avec les cerises que les gens du pays cueillent ils font des tartes ; ils en mettent en conserves dans des bouteilles, ils les mènent à Bar, ils les font sécher et ils en mangent aussi beaucoup, ils font aussi du kirsch, des confitures. »*

Besoin d'aide : Sur le même secteur, il existe une autre variété, encore plus emblématique : la **cerise Dupont.** Nos fiches de descriptions variétales nécessiteraient d'être complétées mais les arbres « mères », octogénaires à l'époque de nos premières études ont, sans aucun doute, disparu depuis bien longtemps. Si vous détenez un cerisier de cette variété ou si une personne de votre connaissance en possède un exemplaire ; votre aide nous est précieuse. N'hésitez pas à nous contacter.

Avec nos remerciements pomologiques

Planter sans se planter :

Quelques conseils … pour mener à bien votre projet de verger

Partie 3

Planter à bonne distance des limites de propriétés



Si vous préférez **planter en mitoyenneté**, plantez les arbres **sur la limite de propriété.**

Dans ce cas, **ils appartiennent aux différents propriétaires concernés** ;

les contraintes d'entretien également !

Planter à bonne distance des autres plantations

Dans un verger haute-tige ou demi-tige, il est recommandé de laisser une distance minimale de 7 m entre les arbres et la limite de propriété.

Si le verger est bordé d'une haie, prévoir 5 m entre la haie et la limite de houppier des arbres : soit 10 à 11 m entre le tronc et la limite pour un pommier, et 11 à 13 m pour un poirier.

En alignement, prévoir une bande en herbe d'au moins 3 m de large au pied des arbres de haute-tige ou demi-tige (1,50 m de part et d'autre du tronc) quand la plantation est réalisée en milieu de parcelle.

Texte et illustration Source PNRL – Oise Pays de France



Planter sans se planter :

Quelques conseils ... pour mener à bien votre projet de verger

Ne pas planter de façon trop dense

On fait souvent l'erreur de planter trop serré ; chaque arbre doit pouvoir prendre sa taille naturelle sans contrainte, ni concurrence entre les arbres pour l'accès aux ressources nutritives et la lumière. (ci-dessous, exemple du pommier)



La distance de plantation dépend des essences fruitières et du type de porte-greffe

Chaque essence fruitière possède un développement spécifique à son espèce ; toutefois hauteur et diamètre sont aussi directement sous l'influence du porte-greffe.

Si la fonction la plus connue du porte greffe est l'adaptabilité à la nature du sol, il est bon de rappeler que son rôle est tout aussi essentiel concernant le développement (hauteur, diamètre) des arbres greffés. Selon le PG utilisé, on pourra obtenir, à souhait et aisément, des arbres de dimensions, vigueur et formes culturales très diversifiées pour se faire un « verger sur mesure », compatible avec ses attentes et... les besoins fondamentaux des arbres.

	Pommier								Poirier			
	M 9		M 26		MM 106		Semi ou franc		Cognassier		Semis ou franc	
	Entre arbres (m)	Entre lignes (m)	Entre arbres (m)	Entre lignes (m)	Entre arbres (m)	Entre lignes (m)	Entre arbres (m)	Entre lignes (m)	Entre arbres (m)	Entre lignes (m)	Entre arbres (m)	Entre lignes (m)
Basse tige	2 - 3	4 - 5	3 - 4	5 - 6	5 - 6	6 - 7			2 - 2,5	4 - 5		
Demi tige					5 - 6	8	8	10			8	10
Haute tige							10 - 12	12 - 15			10 - 12	10 - 12

	Prunier et Pêcher		Cerisier	
	Saint Julien A	Myrobolan	Sainte Lucie	Merisier
	En tous sens (m)	En tous sens (m)	En tous sens (m)	En tous sens (m)
Basse tige	6 à 8		6 à 8	
Demi tige	6 à 8	10 à 12	6 à 8	12 à 15
Haute tige		10 à 12		12 à 15

Les distances préconisées peuvent vous sembler excessives, surtout lors de la plantation de jeunes arbres mais lorsque ceux-ci auront atteint leur taille adulte, vous constaterez qu'elles se justifient pleinement .

Au sommaire du prochain numéro :

Pomologie : 2 célébrités meusiennes observées à la loupe - Planter sans se planter : mener à bien son projet verger (partie 4)

Source, documentations, photos et illustrations (hors mention spécifique) : MNE

Rendez vous au prochain bulletin